

(二十二)  
(楊贊民)

醫學界空前之巨著

中國醫藥大辭典

洋裝兩厚冊 實洋十二元

附利恆編

是書關於醫學名詞。皆廣爲收探。得七萬餘條。三百五十餘萬言。於病證醫方藥品。詳述無遺。即各種方法。凡足以預防生命危險者。亦無不備具。醫界得之。足爲隨證檢查之助。非醫界得之。亦可以考訂方藥。兼得延年却病之術。

分五角四洋實

上海雲南路第一藥房

掛號處啓

知儀署

張望佳梓景直 共五閱新報

丁熹康

---

乃專就狹義的醫學的言之。

起各施其胃腸之能。漸至全身息於筋肉內，旋捲如螺蛳。不虞之害者，更數見不鮮。可由肉食而致。爲害孔多。取滋養素。而滋養素中所含外，尚有最要之維他命 Vit<sub>a</sub>。厥爲植物與果類，維他命缺乏之一要物。而動物則除肝臟他則生命。缺維他命則死。礙。若僅吸蔬果，則生命反爲食。未幾。全舟之人。悉滋養物之最要點。首在維他

食之。則繁殖於人類之腹中。如鳥獸尤甚者也。其症候輕者。則嘔吐。重者則其子因穿膈腸壁。則至殞命。而其它因食獸肉。至罹傷風風濕脚脫疽結核菌等。均為吾人欲喫食物之目的。在乎攝成分。除蛋白質炭水化合物脂肪之存在。而含有維他命最富者。乃生沽素。為吾人生活上不可或之。皆無難他命。然吾人有維他命專食動物者。則生命必起障礙延長。故有航行者。僅恃獸肉以填塞血病。此其明證。故吾人攝取

(未完)



公開古今秘方

社會定期刊

造成百病自療

介紹衛生方法

幸福三日刊

指導健康途徑

### 外證常識

(十一)

(姚夢石)

各研末放入磁器內。用皮紙封好。隔水燉煉。以一枝香爲度。【用法】隨時隨地燉化。攤貼。

【名稱】紅膏

【效能】治癰疽疔毒。【藥用】量及製法。【用法】攤貼。

【名稱】紅膏

【效能】治癰疽疔毒。【藥用】量及製法。【用法】攤貼。

### 經驗良方

治瘋犬咬傷之經驗方

楊舒榮

瘋犬又名邪狗。被其咬傷之厲害。人人曉得。凶險。非用多述。鄰里鄉親。家傳此方。秘而不宣。售價甚昂。余託人僑稱。狗咬傷。犧牲五圓。鈔幣兩張。購得該藥三料。再請藥師甄別。得其藥品及劑量。錄成方。試服不數百。均得良好效果。而不失一。故敢公諸於世。輕者三服。重者五服。未成者減半。

連壽三錢生甘草五分香茅三錢車前子三錢桃仁七粒散紅花一錢五分木通一錢五分銀花三錢黑芝蔴三錢歸尾三錢天花粉三錢紫雲三錢去頭足狼毒五分

加韭菜。赤豆。茄子。羊骨。每味少許。全煎。水三飯盞。煎六分。服時須

### 婦女懷孕與勞病之辨別法

張又良

婦人懷孕。則月經停止。勞病亦月經停止。懷孕而兼手。則月經停止。勞病而兼腹脹。則似懷孕。更有懷孕少形而腹脹。勞病氣逆而腹脹。則似懷孕。若不辨。治必有誤。壽域黃泉。相距咫尺。可不慎哉。爰將兩者之辨法。分述于下。以供家庭之實用焉。

(一)面色。懷孕面色紅潤光澤。或略帶淡黃色。勞病面色枯槁。或兩頰紅赤。

(二)辨舌苔。懷孕則舌上略有薄苔。潤澤。勞病則舌上光絳。潤澤。

(三)辨乳頭。懷孕則乳房漸膨。乳頭呈紅褐色。勞病則乳房乾癟。乳頭呈灰白色。

(四)辨腹部。懷孕三四月之後。腹中漸覺動躍。勞病三四月之後。腹中毫無動躍。

(五)辨症候。懷孕無潮熱盜汗。肌膚甲錯等症。勞病有潮熱盜汗。肌膚甲錯等症。

(六)辨脈象。懷孕之脈。必弦滑而兩關滑甚。勞病之脈。必弦細而兩尺虛甚。

### 大東藥局衛生書籍

新書增時病論  
中西合纂外科大全  
中西合纂婦科大全  
中西合纂幼科大全  
古今名醫驗方類編

書名	編著者	冊數	折實價格
新書增時病論	何廉臣	四冊	七角
中西合纂外科大全	何廉臣	二冊	一元〇八分
中西合纂婦科大全	何廉臣	二冊	一元〇八分
中西合纂幼科大全	何廉臣	二冊	一元〇八分
古今名醫驗方類編	何廉臣	八冊	四元八角

### 百病指南

(張治河)

一爲鼻過盛而無制。一爲正氣虛弱而不支。毒過盛者。多起充血變化。如痘色紫黑。周身熱壯。面赤氣粗。口渴煩躁。便閉澀紅。唇焦舌赤。脈象洪大等是。宜用白虎承氣等湯。通利大便。以殺其勢。正氣虛者。多起貧血變化。如痘色灰白。面色慘淡。精神疲倦。大便清瀉。唇舌色白。脈象沉細等是。宜用保元八珍等方。滋補強心。以助其抗毒能力。又有外寒刺激太甚。肌腠緊者。則宜麻桂升柴等方。以發毛竅。舒張血管。使毒隨汗而泄。濁可以暢泄。

【調攝】

患本症者。宜令靜臥清潔之所。窗戶以紅布。禁風氣。避免風寒。西醫對於發熱。多用冰敷之法。庶不致於發熱。正氣虛也。且血管因寒而收。則出於閉塞。病毒欲出不得。必於內攻。中樞受敵。命必危矣。此法萬不可從。

### 普通疾病看護法

(續)

可用消毒棉蘸樟腦酒。或蘸極稀薄之石炭酸水(百分之五)塗之。倘係齒根膿潰。當時時用微溫湯或硼酸水含漱。如無效驗。須延牙科醫生治之。

七、眼病。每日用微溫之硼酸水洗之。宜避日光。

八、喉病。初起者須用硼砂水或食用水常常含漱。重者須速延醫生治之。

九、熱病。普通治法。初起時用瀉利鹽二三錢。以開水一碗沖服。或服一次。或連服三次。務使腹中宿垢瀉清。去其發熱之根。再用金雞納霜丸。每粒約二厘者。每日服三九。或於發熱前四點鐘服之更佳。每日早晚須注意病人之體溫。用寒暑表測之則較有把握也。